

Renouée des oiseaux

Polygonum aviculare

DICOTYLÉDONES

Noms régionaux : traînasse, centinode, achée, corrigiote, crépinette, herbe-à-cochon, herniolle, herbe-aux-panaris, herbe-de-Saint-Innocent, tirasse.

Données botaniques :

plante annuelle glabre de 10 à 60 cm. Famille des Polygonacées, environ 800 espèces.

Feuilles : alternes, lancéolées à ovales. Elles apparaissent d'abord enroulées en cigare dans l'ochréa argentée, effilochée cachant le pétiole.

Tiges : étalées, ramifiées au sommet.

Fleurs : solitaires ou en petites grappes, blanches à bord rose.

Fruits : secs, indéhiscents, entourés du périanthe persistant.

Reproduction : par graines (100 à 200 par plante).

Floraison : de mai à novembre.

Cycle : annuel.

Types de sols : sols riches en azote.

Région : toutes régions.


STADE ADULTE

- Nombreuses tiges grêles très souvent étalées au sol.



STADE PLANTULE

- Feuilles lancéolées apparaissant d'abord enroulées en cigare dans l'ochréa.



- ① Cotylédons étroits, sessiles, linéaires. Naissent dressés et ne s'étalent jamais complètement.
- ② Axe hypocotylé coloré de rose, peut atteindre 2-3 cm de long.



CE QU'EN PENSE NOTRE MALHERBOLOGUE

Cette plante est nuisible aux récoltes par ses fleurs qui, dans la proportion de 3 grammes par kilo d'avoine, rendent celles-ci impropres à la consommation. Très concurrentielle et très résistante à la sécheresse, elle se développe plus particulièrement dans les cultures estivales.