

Séneçon

Senecio vulgaris

DICOTYLÉDONES

Noms régionaux : séneçon-des-oiseaux, herbe-au-charpentier, petit-séneçon, toute-venue, grand-mouron.

Données botaniques : famille des Astéracées (Composées) dont le genre Séneçon comporte 2 000 espèces. Plante annuelle de 4 à 60 cm.

Feuilles : pennatilobées, vert vif brillant, les supérieures sessiles engainant la tige.

Tiges : peu ramifiées, dressées.

Fleurs : jaunes, en tube, en capitules, bractées souvent noires.

Fruits : akènes surmontés d'une aigrette.

Reproduction : par graines.

Floraison : toute l'année.

Cycle : annuel.

Types de sols : tous types.

Région : toutes régions.

STADE PLANTULE

- Cotylédons allongés elliptiques qui s'amenuisent en pétiole.



① Bord du limbe un peu enroulé sur face inférieure. ② Feuilles obovales-allongées à contour ondulées, lobédentées à presque divisées.



CE QU'EN PENSE NOTRE MALHERBOLOGUE

Cette plante annuelle peut devenir préoccupante lorsque les populations atteignent plusieurs centaines d'individus au m². Sa faible durée de vie, entre 1 à 3 mois, est

compensée par des germinations qui s'étalent toute l'année. Les akènes plumeux sont dispersés par le vent et permettent une colonisation à distance. On rencontre de plus en plus fréquemment la variété *Senecio inaequidens*. Cette variété est en pleine expansion et diffère de *Senecio vulgaris* par son aspect plus gracile.