

Chénopode blanc

Chenopodium album

DICOTYLÉDONES

Noms régionaux : poule-grasse, drageline, grasseline, sénousse, blé-blanc, ansérine, herbeaux-vendangeurs.

Données botaniques : plante annuelle de grande taille (jusqu'à 2 mètres). Famille des Chénopodiaceae, Amaranthaceae.

Feuilles : farineuses face interne, vert bleuté côté extérieur, forme ovale losangique et dentelée. D'abord opposées, les feuilles se décalent peu à peu et deviennent alternes.

Tiges : dressées, anguleuses.

Fleurs : verdâtres, minuscules, groupées en glomérules farineux.

Fruits : graines de forme oblongue, lisses et luisantes.

Reproduction : par graines.

Floraison : de juillet à octobre.

Cycle : annuel.

Types de sols : tous types, particulièrement les sols cultivés non calcaires.


Région : partout en France.

STADE ADULTE

- Les inflorescences à l'aspect granuleux disposées en épi, sont caractéristiques.

STADE PLANTULE

- Apparition très tôt des dentelures des feuilles. Axe hypocotylé de 2 à 2,5 cm.
- Feuilles de taille identique



① Face inférieure des feuilles violacée. Sur la face supérieure des feuilles présence de farine (poils vésiculeux aquifères). ② Cotylédons charnus à court pétiole.



CE QU'EN PENSE NOTRE MALHERBOLOGUE

Le chénopode blanc peut parfois être confondu avec les arroches au stade plantule. L'aspect des cotylédons permet de les différencier : celui du chénopode, violacé à la face inférieure, présente un pétiole court, celui de l'arroche est vert à la face inférieure et s'amenuise en pétiole sans transition nette.