

Brome stérile

Bromus sterilis

GRAMINÉES

Noms régionaux : averon.

Données botaniques :

graminée de 20 à 80 cm de hauteur, dressée et poilue. Famille des Poacées, sous-famille des Festucoïdées.

Inflorescence : panicule très lâche, à longs rameaux filiformes (3-10 cm) et pendants, portant 1 à 3 gros épillets.

Épillet : glabre, large (6,5 mm) avec une arête longue (2 à 3 cm) sur chaque lemme en position subterminale. La lemme est bifide au sommet comme tous les bromes.

Type : annuel TH2.

Préfoliation : enroulée.

Oreillettes : absentes.

Pilosité : abondante dès la F1, hérissée.

Gaine : soudée au tiers supérieur. Nervures rose lilacin sur fond plus clair. Gaine velue.

Ligule : fortement dentée (1,5-2 mm), quelques rares poils possibles sur le dos.

Limbe : hirsute, couvert de longs poils (2 mm). Couleur vert non bleuté.

Semence caractéristique : l'arête scabre (qui accroche) est plus longue que la semence. La semence ne supporte pas l'enfouissement (oxygène).

Floraison : de mai à août.

Types de sols : sur de nombreux sols, fréquente en sols secs et calcaires.

Région : sur l'ensemble de la France.

CONFUSIONS POSSIBLES SUR CRITÈRES

Préfoliation enroulée, gaine soudée, pilosité nette.

Houlques : gaine soudée et velue, teintée de rose violacé. Limbe couleur vert bleuté. Ligule velue sur le dos et la marge.

Houlque laineuse : limbe à pilosité dense et douce au toucher sur les 2 faces. Limbe couleur vert bleuté. En touffes larges.

Houlque molle : vivace à rhizomes. Limbe velu face inférieure, mais pilosité très réduite face supérieure. Limbe couleur vert non bleuté.

Avoine élevée : gaine soudée poilue, limbe cilié. Ligule pubescente.

Avoine-à-chapelets : comme l'avoine élevée mais avec des bulbes empilés.



CE QU'EN PENSE NOTRE MALHERBOLOGUE

Nuisible dans les céréales à paille, elle se rencontre dans les champs et prairies artificielles, elle n'est pas consommée par le bétail. Difficilement contrôlée par les herbicides.