

# Vulpin des champs

*Alopercus myosuroides*

GRAMINÉES

## CONFUSIONS POSSIBLES SUR CRITÈRES

Préfoliation enroulée, glabre à gaine non soudée.

**Phalaris paradoxal:** ligule irrégulièrement dentée, racine anthocyanée, semence à 7 épillets dont 1 seul fertile.

**Jouet-du-vent:** ligule très irrégulièrement dentée (dents de scie de charpentier). Limbe de F4-F5 fortement vrillé. F1 et F3 en gouttière. Pas de liseré blanc.

**Noms régionaux:** queue-de-rat, queue-de-renard des champs, trompe-bonhomme.

**Données botaniques:** c'est à cause de la forme de ses épis longs et violacés, qu'il prend le nom de queue de-renard. Chaume plutôt grêle, il n'excède pas 1 m de haut, avec des nœuds rougeâtres la plupart du temps. Famille des Poacées, sous-famille des Festucoïdées.

**Inflorescence:** panicule contractée en un épi cylindrique portant de nombreux épillets sur des rameaux très courts.

**Épillet:** 2 glumes égales englobant totalement 1 fleuron fertile longuement aristé. Lemme à marges soudées, pas de paléole.

**Type:** annuel TH2.

**Préfoliation:** enroulée.

**Oreillettes:** absentes.

**Pilosité:** plante glabre.

**Gaine:** non soudée, les 2 bords écartés ne se chevauchent pas, liseré blanc sur chaque bord.

**Ligule:** assez régulièrement denticulée.

**Limbe:** couleur vert bleuté, les anthocyanes sont répartis dans toute la plantule. Limbe peu ou pas vrillé.

**Mésocotyle:** long (8 à 10 cm). Peut germer jusqu'à 10 cm.

**Reproduction:** semence.

**Floraison:** d'avril à juillet.

**Types de sols:** sols limoneux, limono-argileux et argilo-calcaires.

**Région:** partout en France, avec un désintérêt pour le Sud-Est trop sec et chaud.



Épis

Plantule



## CE QU'EN PENSE NOTRE MALHERBOLOGUE

Souvent nuisible des cultures d'hiver et de printemps étant donné son abondance. L'aspect de la ligule permet d'enlever toute confusion avec le **jouet-du-vent**.